СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
_____ М.А. САВЕНКОВ
29 ЯНВ 2025

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Антимаст

(Организация-разработчик: ООО «Торговый дом «БиАгро»,
Россия, 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, 4-Б)

Номер регистрационного удостоверения 12-3-11.19-4524№ПВР-3-6.14/03053

I Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: торговое наименование: Антимаст (Antimast).
Международное непатентованное наименование: гентамицин.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

Антимаст в 1 мл в качестве действующего вещества содержит гентамицина сульфат - 17 мг, в качестве вспомогательных веществ - масло подсолнечное рафинированное, вазелин, моноглицериды.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой масляную суспензию беловато-кремового цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства.

Запрещается применять Антимаст по истечении срока годности.

4. Антимаст выпускают расфасованным по 10 мл в шприцы-дозаторы, снабженные канюлей для интрацистернального введения, укупоренные защитными колпачками.

Шприцы-дозаторы, в количестве 20 штук, упакованы в картонную пачку. В каждую пачку вкладывают инструкцию по применению лекарственного препарата.

5. Антимаст хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Антимаст следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II Фармакологические свойства

9. Антимаст относится к фармакотерапевтической группе: аминогликозиды.

10. Гентамицина сульфат представляет собой комплекс антибиотиков, продуцируемых Micromonospora purpurea, обладает широким спектром

антимикробного действия, активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе синегнойной и кишечной палочки, протея, сальмонелл, стафилококков, влияет на штаммы стафилококков, устойчивые к пенициллину; не действует на анаэробные бактерии, вирусы, простейшие.

Механизм бактерицидного действия обусловлен необратимым связыванием антибиотика со специфическими рецепторами бактериальных рибосом и нарушением синтеза мембран, что приводит к гибели бактериальных клеток.

При интрацистернальном введении препарата гентамицин плохо всасывается и оказывает антибактериальное действие в основном в паренхиме молочной железы.

Выводится гентамицин из организма животного в неизменной форме в основном с молоком и в незначительной степени с мочой.

Антимаст по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III Порядок применения

11. Антимаст применяют для лечения мастита у лактирующих коров.

12. Противопоказанием к применению Антимаста является индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата в том числе в анамнезе.

13. При работе с Антимастом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу, после работы следует тщательно вымыть с мылом руки.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Антимастом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, немедленно промыть их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

Пустые шприцы-дозаторы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Отсутствуют противопоказания к применению в период беременности и лактации.

15. Антимаст вводят интрацистернально в дозе 10 мл на одну четверть вымени с интервалом 12 часов в течение 3-4 дней.

Перед введением препарата, из пораженных четвертей вымени выдаивают молоко, соски обрабатывают дезинфицирующим раствором.

Антимаст перед применением подогревают до 35-39 °С. После этого канюлю шприца-дозатора плотно прижимают к отверстию соскового канала и с осторожностью вводят содержимое одного шприца-дозатора.

После введения Антимаста верхушку соска пережимают пальцами на 1-2 минуты и слегка массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного препарата.

16. Побочных явлений и осложнений у коров при применении Антимаста в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не отмечается. В случае появления аллергических реакций, использование препарата прекращают и назначают антигистаминные и симптоматические средства.

17. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

18. Запрещается применение Антимаста одновременно с другими препаратами для интрацистернального введения, а также с ото- и нефротоксичными препаратами (стрептомицином, канамицином, неомицином).

19. Особенностей действия лекарственного препарата при первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

21. Убой коров на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

В пищевых целях молоко используют не ранее, чем через 5 суток после последнего введения Антимаста, при условии полного исчезновения признаков мастита, подтвержденных маститными тестами.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	ООО «Торговый дом «БиАгро», Россия, 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	ООО «Торговый дом «БиАгро», Россия, 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б

Генеральный директор
«ООО «Торговый дом «БиАгро» Снегурова С.А.